Supplementary Files

Table S2 Diagnostic sample characteristics

	Blended CBT (n = 37)	Face-to-face CBT (n = 44)	TAU (n = 40)	Blended CBT vs. Face-to-face CBT		Blended CBT vs. TAU	
	n (%)	n (%)	n (%)	χ^2	p	χ^2	p
Depressive disorder (MDD or Dysthymic disorder)	37 (100%)	44 (100%)	40 (100%)	*		*	
Bipolar disorder	0	0	0	*		*	
Psychotic disorder	0	2 (4.5%)	0	1.72	.19	*	
Panic disorder	1 (2.7%)	4 (9.1%)	1 (2.5%)	1.42	.23	.003	.96
Social phobia	1 (2.7%)	13 (29.5%)	8 (20.0%)	10.13	.001	5.57	.02
Specific phobia	1 (2.7%)	4 (9.1%)	3 (7.5%)	1.42	.23	.90	.34
Separation anxiety	1 (2.7%)	2 (4.5%)	2 (5.0%)	1.91	.66	.27	.60
Generalized Anxiety Disorder	12 (32.4%)	14 (31.8%)	9 (22.5%)	.003	.95	.96	.33
PTSD	1 (2.7%)	3 (6.8%)	3 (7.5%)	.73	.39	.90	.34
Acute Stress Disorder	0	0	1 (2.5%)	*		.94	.33
OCD	0	0	0	*		*	
Anorexia Nervosa	0	1 (2.3%)	0	.85	.36	*	
Bulimia Nervosa	0	1 (2.3%)	0	.85	.36	*	
ADHD	5 (13.5%)	6 (13.6%)	5 (12.5%)	0	.99	.02	.90
Conduct Disorder	0	0	0	*		*	
ODD	0	1 (2.3%)	1 (2.5%)	.85	.36	.94	.33
Tic disorder	1 (2.7%)	0	0	1.20	.27	1.10	.30

Note. *χ^2 was not calculated due to constant values.